

Link do produktu: <http://www.czteryperyroku.sklep.pl/echinerba-30-tabletek-p-339.html>



Echinerba 30 tabletek

Cena	4,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

ECHINERBA

1. Co to jest lek Echinerba® i w jakim celu się go stosuje?

Jest to preparat w postaci tabletek. Lek ma charakter tradycyjny, a jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Stosuje się tradycyjnie jako środek pomocniczy w chorobach przeziębieniowych.

2. Zanim zastosuje się lek Echinerba®

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny złożonych Compositae, gruźlicy, zakażenia wirusem HIV oraz AIDS, białaczek, chorób autoimmunologicznych, jak np. stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy). Nie należy też stosować w przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Echinerba ®:

Stosowanie u osób z rozpoznaną alergią (wziewną, skórą, pokarmową) należy skonsultować lekarzem.

Jeśli przeziębieniu towarzyszy gorączka lub objawy przeziębienia nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem.

ECHINERBA

Ciąża i karmienie piersią:

Z powodu braku danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania preparatów z Echinacea purpurea nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na działanie innych leków. Nie zaleca się stosowania leków o działaniu immunosupresyjnym, jak np. cyklosporyny, metotreksat. W przypadku stosowania glikokortykosteroidów, amiodaronu i ketokonazolu przed zastosowaniem leku Echinerba® należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

3. Jak stosować lek Echinerba®?

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy dziennie. Czas podawania nie powinien być dłuższy niż 10 dni.

W przypadku zażycia większej dawki leku Echinerba® niż zalecana:

Przedawkowanie preparatu może spowodować lekkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Echinerba®:

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Po zastosowaniu preparatów zawierających ziele jeżówki purpurowej mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quincke'go, skurcz oskrzeli, astma i szok anafilaktyczny). U pacjentów atopowych jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną. W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni, może wystąpić leukopenia. W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, duszności lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Echinerba®:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 10450

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Echinerba® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład:

Echinaceae purpureae herbae extractum siccum (4,5-3,5 : 1) 100 mg

Składniki pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia ziemniaczana, koloidalny dwutlenek krzemu (E551),

stearynian magnezu (E470b).

Jedna tabletkka zawiera nie mniej 1 mg kwasów polifenolowych w przeliczeniu na kwas chlorogenowy.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. S. k.

ul. Lubichowska 176b

83-200 Starogard Gdański

tel. 058 561 20 08

fax 058 561 20 16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data opracowania ulotki: wrzesień 2008