

Link do produktu: <http://www.czteryperyroku.sklep.pl/melisa-fix-licz-melisy-fix-30-saszetek-kawon-p-1363.html>



Melisa fix Liść melisy fix 30 saszetek Kawon

Cena	7,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Melisa fix Liść melisy fix 30 x 2,0 g Kawon



Wskazania do stosowania melisy:

Wspomagająco stosuje się w łagodnych stanach napięcia nerwowego jako środek uspokajający.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na liść melisy

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Przedawkowanie:

Dotychczas brak doniesień

Interakcje:

Nieznane

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn:

Produkt może osłabić zdolność koncentracji, szczególnie u osób wrażliwych, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn bezpośrednio po przyjęciu leku.

Sposób stosowania i droga podania:

Stosuje się doustnie w postaci naparu.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 - 2 saszetki (2-4g) zalać 1 szklanką (ok. 200 ml) wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem 10 minut. Pić po szklance naparu 2 - 3 razy dziennie.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż do 25°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr IL-1024/LN

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.